

Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD	+1,25		
OE	+1,25		

Perto	Esf.	Cil.	Eixo
OD			
OE			

Adição +1,00

- Lentes _____
- Favor medir DNP
- Importante: Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.



SANTA
MARIA
LASER
CENTER

PRÓXIMA CONSULTA EM 1 mês

IJUI, 13/01/2020

Dr. Ronaldo Ferretti
CREMERS 22945

Dra. Viviane S. M. Ferretti
CREMERS 27005

Paciente 1

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788

MedicalCenter Rua Venâncio Aires, 35 - Ijuí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br

REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 2.00		
OE	+ 2.50	- 0.50	100

PERTO	
ADIÇÃO	2.50
	_____ Esférico AO

Paciente 2

08/02/2011

Dr. Anderson Lermen

Oftalmologista
Número 22.125

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,50	-1,25	75	Medir
Olho esquerdo	+0,25	-0,50	95	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,50
Olho esquerdo	+2,50

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 3

Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE


	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,00			Medir
Olho esquerdo	+1,75	-0,50	95	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+
Olho esquerdo	+2,75

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 4


Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640


REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 200		
OE	+ 220	- 100	95°

PERTO	
ADIÇÃO	270
	_____ Esférico AO

Paciente 5

05 DEZ. 2019


Dr. Anderson Pereira Lermen
Oftalmologista
Número 22.125

06

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE


	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	-1,00	-1,25	120	Medir
Olho esquerdo	+0,50	-0,75	80	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+3,00
Olho esquerdo	+3,00

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 6




Dr. (a) Heron Gomes Correia
CRM 43888

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 200	- 075	180
OE	+ 200	- 075	90

PERTO	
ADIÇÃO	300
	Esférico AO

Paciente 7


 Dr. Anderson Meira Lermen
 Oftalmologista
 Cremers 22.125

23 SET. 2019

2

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,00			Medir
Olho esquerdo	+0,00			Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+1,00
Olho esquerdo	+1,00

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 8

Dra. Catia Potira Dal Forno
Oftalmologia
CRM 23095

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno
CRM 23095

09

REFRAÇÃO


LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 2.00	- 2.00	90
OE	+ 1.75	- 1.25	110

PERTO	
ADIÇÃO	3.00
	Esférico AO

Paciente 3

05 DEZ. 2019

Dr. Anderson Moura Lermen
Oftalmologista
CRM 22.125



10

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,75	-0,25	145	Medir
Olho esquerdo	+0,75			Medir


ADIÇÃO

Olho direito	+2,25
Olho esquerdo	+2,25

Observação
MULTIFOCAL

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 10


Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

//

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito		-0,75	60	Medir
Olho esquerdo	-1,25			Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 11

Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

12

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+2,75	-2,00	90	Medir
Olho esquerdo	+0,75	-1,75	95	Medir

ADIÇÃO


Olho direito	+2,75
Olho esquerdo	+2,75

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

A paciente retiniana
recarta em 07/01/20.

a

paciente/2


Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

LONGE

O.D Esf. -6,50 Cil. -1,50 Eixo 85°
O.E Esf. -6,50 Cil. -2,00 Eixo 95° Dip. _____

PERTO

O.D Esf. AD Cil. + 2,50 Eixo _____
O.E Esf. _____ Cil. _____ Eixo _____ Dip. _____

Observações: _____

Christian da Silva Presto
Oftalmologista
CRM: 15746

31, 05 de 19 Paciente 13

14

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE


	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito		-0,75	30	Medir
Olho esquerdo		-1,00	45	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,25
Olho esquerdo	+2,25

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 14




Silvestre Muniz de Araújo
Médico
CRM 82.640

Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

15

EXAME DE REFRAÇÃO



		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO
LONGE	OD	Plano	-0,50	130°
	OE	Plano		
PERTO	OD			
	OE			

ADIÇÃO: + 2,25 DNP: *Medin*

OBS.: *Em zula*

Paciente 15

Handwritten signature of Clevio Tosetto.

CRM/RS 32045
 Méd. Oftalmologista
 Clevio Tosetto

Clevio Tosetto
 Médico Oftalmologista
 CRM/RS 32045


REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 1SD	- 400	90°
OE	+ 171	- 421	85°

PERTO	
ADIÇÃO	300
	Esférico AO

Paciente 16

23 SET. 2019


Dr. Anderson Meira Lermen
Oftalmologista
Cremers 22.125

Sr (a).

REFRAÇÃO

	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	- 126		
OE	0	- 126	80

	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD			
OE	Me 300		

OBS:

Data:

21 JAN. 2020

22 JAN. 2020


Parente 17

Dr. Anderson Meira Lermen

Oftalmologista
CRM 122125



EXAME DE REFRAÇÃO



		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO
LONGE	OD	+0,50		
	OE	Plano		
PERTO	OD			
	OE			

ADIÇÃO: +2,25 DNP: medir

OBS.: Em óculos multifocal.

Paciente 18

CRM/RS 32045
 MA Oftalmologista
 Cláudio Toseiro
 Assinatura do Médico

CPF: 022.029.519-03

REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	0		
OE	-1.00	-0.75	90


PERTO	
ADIÇÃO	3.00
	Esférico AO

Paciente 18

06 NOV 2010

Dr. Anderson Pereira Lermen

Oftalmologista
Registro 22.125



REFRAÇÃO


LONGE			
	Esférico	Cilindrico	Eixo
OD	+ 150	-100	110
OE	+ 100		

PERTO	
ADIÇÃO	300
	_____ Esférico AO

Paciente 20

ÓTICA E RELOJOARIA NOVA
Fone (55) 3334-1089
Rua Coronel Soares de Barros, 1401
CEP: 96.740-000 - Aug. Pestana - RS

07 OUT. 2019


Dr. Anderson Weira Lermen
Oftalmologista
CREMERJ 22.125

21

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	-2,00	-1,25	65	Medir
Olho esquerdo		-0,50	125	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,75
Olho esquerdo	+2,75

Observação
MULTIFOCAL
FOTOSENSÍVEL

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 21

Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 12/	- 12/	7/
OE	+ 150	- 100	9/.

PERTO	
ADIÇÃO	300
	Esférico AO

Paciente 22

Dr. Anderson Lermen

Oftalmologista
CRM nº 22.125

06 NOV 2012

23

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,25			Medir
Olho esquerdo	+0,25			Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 23


Cátia Potira Dal Forno
Oftalmologia
CRM 23095

Dr. (a) Cátia Potira Dal Forno
CRM 23095

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,75	-0,25	75	Medir
Olho esquerdo	+0,50	-0,25	135	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,75
Olho esquerdo	+2,75

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 24

Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

REFRAÇÃO

LONGE			
	<i>Esférico</i>	<i>Cilíndrico</i>	<i>Eixo</i>
OD			
OE			

PERTO	
ADIÇÃO	<u>2.00</u> Esférico AO

Reente 25

23 SET 2010



Dr. Anderson Meira Lermen
Oftalmologista
Cremers 22.125

Data de emissão: 27/11/2019 11:20:28

RECEITA MÉDICA

PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS

LONGE:


OD: PLANO, -0,50 X 100

OE: -0,50, ----X----

PERTO:

ADIÇÃO +2,25 AO

Paciente 26



Dr. (a) Christian Da Silva Preto
CRM 28446

Data: 16/12/2019

	Esf.	Cil.	Eixo	DNP(mm)	DP(mm)
O.D.	+0,25				
O.E.	+0,25				

Adição para perto O.D.: +2,50
O.E.: +2,50

Observações

multifocais

Paciente 27

DR. ALEXANDRE EL AMMAR MÜLLER
OPTALMOLOGISTA
CREMERS 25165

RUA 14 DE JULHO, 149 - SALA 506 - CENTRO - IJUÍ - RS
FONE: (55) 3333-4794

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+2,25	-1,00	95	Medir
Olho esquerdo	+1,75	-1,75	35	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+3,00
Olho esquerdo	+3,00

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 28

Dra. Catia Potira Dal Forno
Oftalmologia
CRM 23095

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno
CRM 23095

29

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	-4,25	-2,50	40	Medir
Olho esquerdo	-4,50	-2,25	130	Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 29

Dra. Catia Potira Dal Forno
Oftalmologia
CRM 23095

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno
CRM 23095

REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 1.75	- 0.75	115
OE	+ 1.25	- 0.75	80

PERTO	
ADIÇÃO	2.00
	Esférico AO

Paciente 30

07 OUT. 2019

Dr. Anderson Weira Lermen

Oftalmologista
CRMers 22.125

RECEITA MÉDICA

31

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	-1,50			Medir
Olho esquerdo	-0,50			Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 31

Dr. (a) Silvéstre Muniz De Araújo
CRM 82640

REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	—		
OE	+ 2.75	- 0.75	180

PERTO	
ADIÇÃO	3.00
	Esférico AO

Paciente 32


Dr. Anderson Meira Lermen
Oftalmologista
Crmers 22.125

23 SET. 2019

33

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,50	-0,50	110	Medir
Olho esquerdo	+0,00	-0,50	80	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+3,00
Olho esquerdo	+3,00

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 33

Dra. Catia Potira Dal Forno
Oftalmologia
CRM 23095

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno
CRM 23095

swl

$$OD: +0,50 DE = -0,50 DC 80^\circ$$

$$OE: +1,25 DE = -0,75 DC 85^\circ$$

$$Alto: +2,75 DE 40$$

OP a medir
multifocal

Paciente 34

Silvestre Muniz de Araújo
Médico
CRM 82.640

DATA: 16/01/2020

Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD			
OE			

Perto	Esf.	Cil.	Eixo
OD	+2,00	_____	
OE	+2,25	_____	

Adição _____

✓ Lentes _____

✓ Favor medir DNP

✓ Importante: Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.

PRÓXIMA CONSULTA EM 1 ano

Juí, 05/02/2019

26/9/19

Dr. Ronaldo Ferretti
CREMERS 22945

Dra. Viviane S. M. Ferretti
CREMERS 27005

Paciente 35

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788

L Medical

Rua Venâncio Aires, 35 - Ijuí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br

RECEITA MÉDICA

PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS

LONGE:

OD: +4,00, -1,00x80

OE: +4,00, -1,00x95

PERTO:

ADIÇÃO +2,50 AO

Paciente 36

Dr. Christian da Silva Pretto
Oftalmologista
CRM 28446

Dr. (a) Christian Da Silva Pretto
CRM 28446

Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD	-2,00	-0,25	95°
OE	-2,00	—	—

Perto	Esf.	Cil.	Eixo
OD			
OE			

OPTALMOCLINICA FERRETTI
 Rua Venâncio Aires, 35 - Ijuí/RS - CEP: 97119-000

Rx: 3722
 Data: 10/07/19
 Lentes

Adição _____

- Favor medir DNP
- Importante: Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.

PROXIMA CONSULTA EM 6 meses



SANTA MARIA LASER CENTER

Ijuí, 08/07/2019

Dr. Ronaldo Ferretti
CREMERS 22945

Dra. Viviane S. M. Ferretti
CREMERS 27005

Paciente 37

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788



Medical Center

Rua Venâncio Aires, 35 - Ijuí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br

38

RECEITA MÉDICA

PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS

LONGE:


OD:-----,-----X-----

OE:-----,-----X-----

PERTO:

ADIÇÃO +1,75 AO

Paciente 38



Dr. (a) Christian Da Silva Pretto
CRM 28446

39

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito		-0,50	65	Medir
Olho esquerdo	+0,25	-0,75	105	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,25
Olho esquerdo	+2,25

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 39


Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

40

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,75	-0,25	170	Medir
Olho esquerdo	+0,25			Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,50
Olho esquerdo	+2,50

MULTIFOCAL

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 40


Dr. (a) Silvestre Muniz De Araújo
CRM 82640

41

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS


LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,00	-1,50	170	Medir
Olho esquerdo	-0,50			Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+3,00
Olho esquerdo	+3,00

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.



Paciente 41

Dr. (a) Heron Gomes Correia
CRM 43888

42

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,50	-0,50	180	Medir
Olho esquerdo	+0,75	-0,25	180	Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 42

Dra. Catia Potira Dal Forno
Oftalmologia
CRM 23095

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno
CRM 23095

43


RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

perto

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+1,00			Medir
Olho esquerdo	+1,00			Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.



Patricia Marcela Mesquini
CRM 43584

Paciente 43

Dr. (a) Patricia Marcela Mesquini
CRM 43584